

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Υποασβεστιαμία (Επιλόχειος πάρεση)

- Χαμηλή συγκέντρωση ασβεστίου στο αίμα συνήθως (3-4 ημέρες) μετά τον τοκετό → ανεπαρκής εφοδιασμός του μυϊκού συστήματος. Συχνότερη κατάσταση στο κρύο, σε ζώα που διατράφηκαν πολύ πλούσια κατά την εγκυμοσύνη, σε ζώα προχωρημένης ηλικίας.
- Μειωμένη λήψη τροφής, μειωμένη κινητικότητα εντέρου, ανεπαρκή σιτηρέσια σε βιταμίνη D3, χαμηλή περιεκτικότητα σιτηρεσίου σε P, λανθασμένη αναλογία Ca:P
- Ανησυχία και προοδευτικά κατάπτωση, στερνική κατάκλιση με το κεφάλι στραμμένο προς τα πίσω, δύσπνοια, αδυναμία ανέγερσης, διάρροια.
- Διάγνωση → σχετικά απλή με μέτρηση του pH των ούρων → > 8 ένδειξη αλκάλωσης
- Χωρίς έγκαιρη θεραπεία → πλάγια κατάκλιση, τυμπανισμός και θάνατος.