

# Doxx-Sol<sup>®</sup> 500 mg/g

Doxx-Sol 500 mg/g υπό μορφή σκόνης για χρήση σε πόσιμο νερό/υποκατάστατο γάλακτος για προ-μηρυκαστικούς μόσχους, χοίρους και όρνιθες  
Δοξουκυκλίνη hyclate

## 1 kg

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1 γρ. περιέχει:  
Δοξουκυκλίνη hyclate 500 mg (ισοδύναμη με 433 mg δοξουκυκλίνης)

### ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Από του στόματος χρήση μετά από διάλυση σε πόσιμο νερό/υποκατάστατο γάλακτος. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση.

### ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εντόσθια:  
Μόσχοι: 7 ημέρες  
Χοίροι: 8 ημέρες  
Όρνιθες: 5 ημέρες  
Δεν έχει εγκριθεί η χρήση σε πτηνά κατά την περίοδο της ωοτοκίας που παράγουν αυγά για ανθρώπινη κατανάλωση.

### ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

74695/19-10-2015

CY00494V

### ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

- Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσεως, πριν από τη χρήση.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

- Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση - να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες.  
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε πόσιμο νερό: 24 ώρες.  
Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σε υποκατάστατο γάλακτος: 4 ώρες.

Μετά το πρώτο άνοιγμα χρήση έως:

EXP

Batch



ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Huvepharma NV • Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerp • Belgium (Βέλγιο)



5 414916 405203



C/PP/ALU/LOPE

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΒΟΕΙΔΗ (ΠΡΟ-ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΟΙ ΜΟΣΧΟΙ), ΧΟΙΡΟΙ, ΟΡΝΙΘΕΣ, (ΠΑΧΥΝΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΥΛΑΔΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)