

HL285v1-Phar100wsg1,1-EL0212

# Pharmasin<sup>®</sup> 100 % Κ/Β

Κοκκία για χορήγηση με το πόσιμο νερό  
για μόσχους, χοίρους, ορνίθια, και ινδόρνιθες  
Tylosin (ως Tylosin Tartrate)

1,1 kg

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1.1 g κοκκίων περιέχουν  
1 g tylosin (που αντιστοιχούν σε 1.1 g  
tylosin-tartrate).

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε το φυλλάδιο της συσκευασίας  
πριν τη χρήση

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε το φυλλάδιο της συσκευασίας  
πριν τη χρήση

## ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

- Μόσχοι (κρέας και εδώδιμο ιστοί): 12  
ημέρες
- Χοίροι (κρέας και εδώδιμο ιστοί): 1  
ημέρα
- Ινδόρνιθες (κρέας και εδώδιμο ιστοί): 2  
ημέρες
- Ορνίθια (κρέας και εδώδιμο ιστοί): 1  
ημέρα
- Ορνίθια - Ινδόρνιθες (αυγά): 0 ημέρες

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ  
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ  
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:  
Huvepharma NV • Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerpen • Βέλγιο

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2523/20-1-12

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

• Διαβάστε το φυλλάδιο οδηγιών για πλήρεις  
οδηγίες και προειδοποιήσεις χρήστη πριν τη  
χρήση.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

- ΙΝα φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για  
να προσταχθεί από το φως.
- ΙΜην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη  
των 30°C.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΗ  
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η  
ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  
ΠΡΟΪΟΝ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

- Διαβάστε το φυλλάδιο της συσκευασίας πριν  
τη χρήση.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν  
και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Διάρκεια ζωής μετά τη διάλυση ή ανασύσταση σε  
νερό, γάλα ή υποκατάστατο γάλακτος: 24 ώρες  
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της  
στοιχειώδους συσκευασίας: 3 μήνες

Αφού ανοιχθεί, χρήση έως:

**ΛΗΞΗ (μήνας/έτος)**

<Παρτίδα>



519099901872541

ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΜΟΣΧΟΙ • ΧΟΙΡΟΙ • ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΟΡΝΙΘΕΣ

