

Pigfen® 40 mg/g

κοκκία για χοίρους
Fenbendazole

1 kg

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ανά γραμμάριο:
Fenbendazole 40 mg

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη θεραπεία των χοίρων που έχουν προσβληθεί από *Ascaris suum* (ενήλικα και μεταναστευτικά προνυμφικά στάδια).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης, πριν από τη χρήση.

Μπορεί να χορηγηθεί στους χοίρους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δοσολογικά σχήματα:

- Εφάπαξ δόση των 5 mg φενβενδαζόλη (αντιστοιχούν σε 125 mg του προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους (μεταναστευτικά προνυμφικά, εντερικά προνυμφικά και ενήλικα στάδια),
- 0,72 mg φενβενδαζόλη (αντιστοιχούν σε 18 mg του προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα για 7 συνεχόμενες ημέρες (εντερικά προνυμφικά και ενήλικα στάδια),
- 0,36 mg φενβενδαζόλη (αντιστοιχούν σε 9 mg του προϊόντος) ανά kg σωματικού βάρους ανά ημέρα για 14 συνεχόμενες ημέρες (εντερικά

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:
4 ημέρες



HUVEPHARMA®

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Huvepharma NV • Uitbreidingsstraat 80
2600 Αμβέρσα • Βέλγιο

ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α.Α.Κ. Κύπρου: CY00528V
Α.Α.Κ. Ελλάδας: 22723/9-3-2016

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

- Μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ως είναι συσκευασμένο προς πώληση: Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.
- Απόρριψη: βλ.εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση. Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή. Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μετά το πρώτο άνοιγμα: 3 μήνες.
Μόλις ανοιχτεί, χρησιμοποιήστε έως

ΛΗΞΗ:

Παρτίδα:



KOKKIA

ΧΟΙΡΟΙ

