



Υποκατάστατο γάλακτος σε σκόνη για μοσχάρια

- Ιδανική κοκκομετρία •
- Υψηλή διαλυτότητα •
- Ελκυστική οσμή •
- Χαμηλά ποσοστά τέφρας που ελαχιστοποιούν τα φαινόμενα διάρροιας •
- Υψηλή συμπερίληψη γαλακτικών στοιχείων •

Πρόγραμμα Χορήγησης

Ημέρα	Ποσότητα	Χορήγηση ανά ημέρα	Συμπληρωματική Διατροφή
1	4-6 λίτρα πρωτόγαλα		
2-3	2 λίτρα	3 φορές	Νερό + Τριφύλλι σανό
4-10	2 λίτρα	2 φορές	
11-15	2,5 λίτρα	2 φορές	
3η εβδ.	3 λίτρα	2 φορές	Νερό + Τριφύλλι σανό + Μίγμα ΣΖ κ.β.
4η-6η εβδ.	3,5 λίτρα	2 φορές	
7η εβδ.	2,5 λίτρα	2 φορές	
8η εβδ.	2 λίτρα	2 φορές	
9η-10η εβδ.	1,5 λίτρα	2 φορές	
11η εβδ.	2 λίτρα	1 φορά	

Διατροφικά Στοιχεία

Ολικές αζωτούχες ουσίες (%)	21	Τέφρα (%)	max 6.5
Ολικές λιπαρές ουσίες (%)	17	Βιταμίνη A (IU/kg)	27.500
Λακτόζη (%)	42.5	Βιταμίνη D3 (IU/kg)	3.000
Ασβέστιο (%)	0.8	Βιταμίνη E (mg/kg)	150
Φώσφορος (%)	0.6	Βιταμίνη C (mg/kg)	250

Οδηγίες χρήσης

Ανάμειξη 125-150 γραμμάρια σκόνης υποκατάστατου γάλακτος σε 1 λίτρο νερό.

Θερμοκρασία νερού κατά την διάλυση και ανάμειξη 45 °C, θερμοκρασία χορήγησης γάλακτος 40 °C.

Ανάμειξη με αναδευτήρα, σε μηχανή ανάδευσης ή μηχανή τεχνητής γαλουχίας.

Προσοχή: Η συσκευασία να διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήσιμες συμβουλές

- Εξασφάλιση ξεχωριστού και καθαρού χώρου τοκετού.
- Υψιστης σημασίας η λήψη επαρκούς και καλής ποιότητας πρωτογάλακτος από το νεογέννητο:
2 λίτρα σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών αμέσως μετά τον τοκετό, το ελάχιστο 6 λίτρα μέσα σε 12 ώρες.
- Προσαρμογή της ποσότητας του γάλακτος ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση των μοσχарιών: το παραπάνω πρόγραμμα χορήγησης γάλακτος είναι προσαρμοσμένο για μοσχάρια με σωματικό βάρος γέννησης περίπου 40 κιλά.
- Καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού μετά από κάθε τάισμα.
- Η στέγαση των μοσχарιών να γίνεται μακριά από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.
- Ο χώρος στέγασης να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται τακτικά, και να προστατεύεται από ψυχρά ρεύματα αέρα.
- Τακτική παρακολούθηση των μοσχарιών για έλεγχο ανάπτυξης (αύξηση σωματικού βάρους) και ενδείξεις ασθενειών, όπως διάρροιες και συμπτώματα αναπνευστικού.

Χονδροειδείς ζωοτροφές και νερό

Όλα τα μοσχάρια πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους άφθονο, καθαρό και φρέσκο νερό από την 1η ημέρα της ζωής τους, καθώς και καλής ποιότητας τριφύλλι σανό από την 2η εβδομάδα.

Εναρκτήριο μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών

Χορήγηση καλής ποιότητας συμπυκνωμένες ζωοτροφές κατά βούληση από την 2η εβδομάδα ζωής.

Προδιαγραφές εναρκτηρίου μίγματος θηλασμού

Ολικές αζωτούχες ουσίες (%)	18-20	Λυσίνη (gr/Kg)	15
Ολικές λιπαρές ουσίες (%)	5-8	Ασβέστιο (%)	0,75
Ενέργεια (MJ ME/kg)	12	Φώσφορος (%)	0,45-0,5
NDF (%)	min 12,5		

* Ιδανικά, η τροφή να χορηγείται σε pellet 3mm και να καταρτίζεται από εύπεπτες Α ύλες

Ρυθμός ανάπτυξης

Η μέση ημερήσια αύξηση βάρους πρέπει να είναι 0,6-0,8 κιλά/ημέρα.

Ηλικία (μήνες)	Σωματικό βάρος (Kg)	Ύψος (cm)
1ο	63-69	84
2ο	81-93	86
3ο	99-117	91

* Ο υπολογισμός έχει γίνει με δεδομένο βάρος γέννησης 45 κιλά, μοσχάρι φυλής Holstein.

* Η μέση ημερήσια αύξηση βάρους εξαρτάται από τη φυλή, το φύλο και το γενετικό δυναμικό.

Διάρροιες

Αίτια	Ειδικές διάρροιες	Μη ειδικές διάρροιες
Ιοί, Βακτήρια, Παράσιτα, Πρωτόζωα	√	
Διατροφή		√

Ταξινόμηση



0 / φυσιολογική σύσταση κοπράνων

1 / ημι-σχηματισμένη, κολλώδη, μαλακή σύσταση κοπράνων

2 / μαλακή σύσταση κοπράνων

3 / υδαρής σύσταση κοπράνων

*Συμπληρωματικά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το χρώμα, η οσμή και η παρουσία αίματος στα κόπρανα.

Απογαλακτισμός

Ο απογαλακτισμός μπορεί να ξεκινήσει όταν το ζώο κρίνεται υγιές, σε καλή θρεπτική κατάσταση και καταναλώνει τουλάχιστον 1,5-2 Kg μίγματος απογαλακτισμού ανά ημέρα.

Το προϊόν παράγεται στις εγκαταστάσεις μας στο Σχηματάρι Βοιωτίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 και FAMI QS.



nuevo

Θέση Ρουθούνια, Σχηματάρι Βοιωτίας, 320 09
τηλ: 22620 57200-202 | fax: 22620 59325 | e-mail: info@nuevo-group.com

22 Bridge Street, Cavan, H12 DE20, Co. Cavan, Ireland
τηλ: +353 87 101 9572 | e-mail: office@nuevo-group.com



www.nuevo-group.com