



Υποκατάστατο γάλακτος σε σκόνη για αμνοερίφια

- Ιδανική κοκκομετρία •
- Υψηλή διαλυτότητα •
- Ελκυστική οσμή •
- Χαμηλά ποσοστά τέφρας που ελαχιστοποιούν τα φαινόμενα διάρροιας •
- Υψηλή συμπερίληψη γαλακτικών στοιχείων •

Πρόγραμμα Χορήγησης

Ημέρα	Ποσότητα	Χορήγηση ανά ημέρα	Συμπληρωματική Διατροφή
1	150 gr πρωτόγαλα/Kg ZB		
2-3	0,4 λίτρα	3 φορές	Νερό + Τριφύλλι
4-7	0,5 λίτρα	3 φορές	
8-14	0,6 λίτρα	3 φορές	Νερό + Τριφύλλι + Μίγμα ΣΖ κ.β.
3η εβδ.	0,75 λίτρα	2 φορές	
4η εβδ.	1 λίτρο	2 φορές	
5η εβδ.	1 λίτρο	2 φορές	
6η εβδ.	0,75 λίτρα	2 φορές	
7η εβδ.	0,5 λίτρα	2 φορές	

Διατροφικά Στοιχεία

Ολικές αζωτούχες ουσίες (%)	23	Τέφρα (%)	max 6,5
Ολικές λιπαρές ουσίες (%)	26	Βιταμίνη A (IU/kg)	20.000
Λακτόζη (%)	42,5	Βιταμίνη D3 (IU/kg)	3.000
Ασβέστιο (%)	0,75	Βιταμίνη E (mg/kg)	125
Φώσφορος (%)	0,65	Βιταμίνη C (mg/kg)	100

Οδηγίες χρήσης

Ανάμειξη για την 1η εβδομάδα: 175 γραμμάρια σκόνης υποκατάστατου γάλακτος σε 1 λίτρο νερό.
Μετά τη 2η εβδομάδα: ανάμειξη 200 γραμμάρια σκόνης υποκατάστατου γάλακτος σε 1 λίτρο νερό.
Θερμοκρασία νερού κατά την διάλυση και ανάμειξη 48°-50°C, θερμοκρασία χορήγησης γάλακτος 40°-42°C.
Ανάμειξη με αναδευτήρα, σε μηχανή ανάδευσης ή μηχανή τεχνητής γαλουχίας.

Προσοχή: Η συσκευασία να διατηρείται σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Χρήσιμες συμβουλές

- Εξασφάλιση ξεχωριστού και καθαρού χώρου τοκετού.
- Ύψιστης σημασίας η λήψη επαρκούς και καλής ποιότητας πρωτόγαλακτος από το νεογέννητο: min 100 gr/Kg ZB.
- Προσαρμογή της ποσότητας του γάλακτος ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση των αρνιών: το παραπάνω πρόγραμμα χορήγησης γάλακτος είναι προσαρμοσμένο για αρνιά με σωματικό βάρος γέννησης περίπου 4 κιλά.
- Καθαρισμός και απολύμανση του εξοπλισμού μετά από κάθε τάισμα.

- Η στέγασση των αρνιών να γίνεται μακριά από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.
- Ο χώρος να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται τακτικά και να προστατεύεται από έντονα ρεύματα αέρα.
- Τακτική παρακολούθηση των αρνιών για έλεγχο ανάπτυξης (αύξηση σωματικού βάρους) και ενδείξεις ασθενειών, όπως διάρροιες και συμπτώματα αναπνευστικού.

Χονδροειδείς ζωοτροφές και νερό

Όλα τα αρνιά πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους άφθονο, καθαρό και φρέσκο νερό από την 1η ημέρα της ζωής τους, καθώς και καλής ποιότητας τριφύλλι από την 1η εβδομάδα.

Εναρκτήριο μίγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών

Χορήγηση καλής ποιότητας συμπυκνωμένες ζωοτροφές κατά βούληση (πρακτικά καταναλώσεις 150-200 gr/ημέρα/ζώο) ιδανικά σε μορφή pellet 3mm από την 2η εβδομάδα ζωής. Η πρόσληψη από την 2η-3η εβδομάδα συμπληρωματικής τροφής, επιταχύνει σημαντικά την εξέλιξη του πεπτικού συστήματος σε τύπου πέψης μηρυκαστικών.

Μετεξέλιξη πεπτικού συστήματος

- **1η φάση:** 3 εβδομάδες, χαμηλή κατανάλωση συμπληρωματικής τροφής, δράση πεπτικού συστήματος ως μονογαστρικό.
- **2η φάση:** 4-7 εβδομάδες, μεταβατική, η διάρκεια επηρεάζεται ανάλογα με τον τύπο και βαθμό κατανάλωσης συμπληρωματικής διατροφής.
- **3η φάση:** > 7η εβδομάδα, τύπος πέψης ενήλικων μηρυκαστικών.

Ρυθμός ανάπτυξης


Η ημερήσια εναπόθεση βάρους, εξαρτάται από την φυλή (βάρους γέννησης), την ποιότητα διατροφής και την τεχνική παρασκευής & χορήγησης υποκατάστατου γάλακτος.

Επιθυμητή απόδοση (2η ημέρα - 35η ημέρα): 250 γραμμάρια/ημέρα

Απογαλακτισμός

Ο απογαλακτισμός μπορεί να ξεκινήσει όταν το ζώο κρίνεται υγιές, σε καλή θρεπτική κατάσταση (35-40 ημέρες/11-13 Kg σωματικού βάρους) και καταναλώνει 300-350 γραμμάρια μίγματος απογαλακτισμού + τριφυλλίου ανά ημέρα.

Το προϊόν παράγεται στις εγκαταστάσεις μας στο Σχηματάρι Βοιωτίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας ISO 22000:2018, ISO 9001:2015 και FAMI QS.



nuevo

Θέση Ρουθούνια, Σχηματάρι Βοιωτίας, 320 09
τηλ: 22620 57200-202 | fax: 22620 59325 | e-mail: info@nuevo-group.com

22 Bridge Street, Cavan, H12 DE20, Co. Cavan, Ireland
τηλ: +353 87 101 9572 | e-mail: office@nuevo-group.com



www.nuevo-group.com